

INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE

Cell-Chex® is an assayed control intended for monitoring total cell counts performed manually using a hemacytometer to validate quantitation of red and white blood cells in patient cerebrospinal fluid and body fluid samples including pleural, pericardial, peritoneal and synovial fluid. Level 1-UC contains monosodium urate crystals, and Level 1-CC contains Calcium Pyrophosphate Dihydrate (CPPD) crystals, which can be used to monitor the presence of crystals in synovial fluid.

Cell-Chex is also intended for monitoring white blood cell differentiation (Mononuclear and Polymorphonuclear; Neutrophils, Eosinophils, Basophils, Lymphocytes and Monocytes) in body fluid samples performed using Cytospin smears.

SUMMARY AND PRINCIPLES

Microscopic evaluation of cerebrospinal fluid and other body fluids is an important part of the routine analysis of body fluid specimens. Total cell count, crystal identification and white cell differential count can provide valuable information regarding infection, hemorrhage, malignancy, inflammatory conditions and irritation of joint spaces. Total cell counts and crystal identification are performed with a hemacytometer using undiluted or diluted body fluid. Crystal analysis can be performed using light or polarized light microscopy following routine lab protocol for crystal identification. Differential cell counts of body fluids are performed using Cytospin smears stained using routine hematology staining techniques.

When handled like a patient sample, Cell-Chex body fluid control will provide total cell counts and differential cell counts within the expected ranges indicated on the assay sheet.

REAGENTS

Cell-Chex body fluid control contains stabilized human red blood cells, human white blood cells, monosodium urate crystals (Level 1-UC only) and CPPD crystals (Level 1-CC only) in a preservative medium.

PRECAUTIONS

1. For In Vitro Diagnostic Use.
2. CAUTION: All blood products should be treated as potentially infectious. Source material from which this product was derived was found negative when tested in accordance with current FDA required tests. No known test methods can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents. See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [streck.com](#) for specific FDA required blood tests.
3. This product should not be disposed in general waste, but should be disposed with infectious medical waste. Disposal by incineration is recommended.
4. This product is intended for use as supplied. Adulteration by addition of any materials to the product as supplied invalidates any diagnostic use of the product. Exception: If Level 2 control is diluted as indicated in 3.a. under Instructions for Use.
5. SDS can be obtained at [streck.com](#), by calling 800-843-0912, or by calling your local supplier.

STORAGE AND STABILITY

Cell-Chex body fluid control is stable through the expiration date when stored at 2 °C to 10 °C. After opening, Cell-Chex is stable throughout the open-vial dating, as indicated on the assay sheet, when stored at 2 °C to 10 °C.

INDICATION OF PRODUCT DETERIORATION

Inability to obtain expected values for total cell counts or the inability to differentiate the cell types may indicate product deterioration. If the recovered values are not within the expected ranges:

1. Review the control product package insert Instructions For Use and Limitations sections.
2. Check the expiration date of Cell-Chex. Discard outdated product.
3. Assay an unopened vial of Cell-Chex. If the values are still outside the expected range, contact Streck Technical Services at 800-843-0912 or [technicalservices@streck.com](#).

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the controls from the refrigerator. It is not necessary to warm the controls to room temperature before using.
2. To mix: (Do NOT mix mechanically or vortex.)
For a video demonstration, visit [streck.com/mixing](#).

- a. Hold the vial vertically and roll each vial between the palms of the hands for 15-20 seconds.



- b. Continue to mix by holding the vial by the ends between the thumb and finger, rapidly inverting the vial 20 times end-over-end using a very quick turning motion of the wrist.



- c. Analyze immediately after mixing. Subsequent analyses during this test period may be performed by inverting the vial 5 times prior to sampling.
- d. Steps a-c must be repeated upon removing the sample from the refrigerator for the entire open-vial time period.
3. Samples must be removed using a clean capillary tube or pipette tip. The vial must be closed immediately after sampling is complete. Care should be taken to prevent cross-contamination of the control.
- a. For hemacytometer counts, refer to your hemacytometer package insert for specific instructions. The Level 2 control is concentrated enough to perform a dilution and obtain a reportable value.
- b. If using Cell-Chex for synovial fluid control and crystal analysis, further crystal evaluation of a positive control can be performed using polarized light microscopy or by following established lab protocol for synovial fluid analysis.

- c. For white blood cell differential counts, prepare a Cytospin smear according to your established laboratory procedure. For best results, use 250µl of control product. **Addition of any material to Cell-Chex prior to preparation of a smear is not necessary or recommended.** Stain the Cytospin smear of Cell-Chex according to your established laboratory procedure for routine hematology. **The differential preparation used to obtain Cell-Chex assay values is centrifuged for 7 minutes at 500 RPMs.**

4. After sampling, return to refrigeration for maximum open-vial stability. Wipe the threads of both the vial and cap before replacing cap and returning to refrigeration.

LIMITATIONS

1. Analysis of Cell-Chex cannot be performed on an automated hematology analyzer. The stabilization process of the red blood cells will cause them to interfere with the white blood cell count.
2. Cell-Chex white blood cells are stabilized. Pretreatment of Cell-Chex prior to preparation of a Cytospin smear is not necessary.

EXPECTED RESULTS

The assigned values for red blood cells, white blood cells and differential values were determined by replicate analyses of hemacytometer counts and stained Cytospin smears. The assigned values of the total cell counts are based on the average number of cells per µL counted in the nine large gridded squares on both sides of the Neubauer Improved hemacytometer counting chamber. The assigned values of the differential cell counts are based on replicate 100-cell differentials. Assay range values were established based on +/- 3SD for WBC differential parameters and +/- 2SD for the RBC and WBC parameters. Upon receipt of a new control lot, it is good laboratory practice that an individual laboratory establish its own mean and limits for each parameter. However, the control means established by the laboratory should fall within the expected range specified for the control.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The assigned cellular component assay values are presented as a mean and a recovery range. The mean cellular component assay values are derived from repetitive testing on multiple vials of product using Neubauer Improved hemacytometers, which are operated and maintained according to the manufacturer's instructions. White cell differential cellular assay values were determined by evaluating repetitive Cytospin smears from different vials run according to the manufacturer's instructions. Crystals are identified as "present" or "not present", do not have a recovery range, and are determined visually using hemacytometers on representative vials. The recovery ranges for cellular components are intended to reflect laboratory variability, thus, they are within +/- 3SD for WBC differential parameters and +/- 2SD for the RBC and WBC parameters. Always perform quality control according to good laboratory practice, laboratory director's requirements, and any regulatory or accredited requirements.

QUALITY CONTROL PROGRAM

Streck offers STATS®, an interlaboratory quality control program, to all customers at no charge. For more information, contact the STATS Department at 800-898-9563 or [statsdata@streck.com](#). Additional information can be found at [streck.com](#).

ORDERING INFORMATION

Please call our Customer Service Department at 800-228-6090 for assistance. Additional information can be found online at [streck.com](#).

Rx Only

GLOSSARY OF SYMBOLS

See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [streck.com](#).

See [streck.com/patents](#) for patents that may be applicable to this product.



350468-16
2020-04

MODE D'EMPLOI**USAGE PRÉVU**

Cell-Chex® est un contrôle dosé utilisé pour la surveillance de numérations cellulaires totales effectuée manuellement à l'aide d'un hémocytomètre pour valider la quantification des globules blancs et rouges dans le liquide céphalorachidien et les échantillons de fluides corporels d'un patient, notamment liquide pleural, péricardique, péritonéal et synovial. Le Niveau 1-UC contient des cristaux d'urate monosodique et le Niveau 1-CC des cristaux de pyrophosphate dihydrate de calcium (CPPD), qui peuvent être utilisés pour surveiller la présence de cristaux dans le liquide synovial.

Cell-Chex est également utilisé pour la surveillance de la différenciation des globules blancs (mononucléaires et polymorphonucléaires ; neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes et monocytes) dans les échantillons de fluides corporels à l'aide de frottis Cytospin.

RÉSUMÉ ET PRINCIPES

L'évaluation microscopique du liquide céphalorachidien et d'autres fluides corporels est une partie importante de l'analyse de routine des échantillons de fluides corporels. Une numération cellulaire totale, une identification des cristaux et une numération différentielle des globules blancs peuvent fournir des informations précieuses au sujet d'une infection, d'une hémorragie, d'une malignité, d'une inflammation et d'une irritation des espaces articulaires. Les numérations cellulaires totales et l'identification des cristaux sont effectuées à l'aide d'un hémocytomètre et d'un fluide corporel dilué ou non. L'analyse des cristaux peut être effectuée par microscopie en lumière ou lumière polarisée en suivant le protocole du laboratoire pour l'identification des cristaux. Les numérations cellulaires différentielles de fluides corporels sont effectuées à l'aide de frottis Cytospin colorés par des techniques de coloration hématologiques standard.

Traité comme un échantillon patient, le contrôle de fluide corporel Cell-Chex fournira des numérations cellulaires totales et des numérations cellulaires différentielles dans les intervalles attendus, indiqués sur la feuille de dosage.

RÉACTIFS

Le contrôle de fluide corporel Cell-Chex contient des globules rouges humains, des globules blancs humains et des cristaux d'urate monosodique (Niveau 1-UC seulement) et des cristaux de CPPD (Niveau 1-CC seulement) stabilisés dans un conservateur.

PRÉCAUTIONS

- Pour usage diagnostique in vitro.
- ATTENTION :** Tous les produits sanguins doivent être traités comme potentiellement infectieux. Le matériel d'origine à partir duquel ce produit est dérivé s'est avéré négatif après soumission aux tests actuellement exigés par la FDA. Aucune méthode de test connue ne peut garantir que les produits dérivés du sang humain ne transmettront pas d'agents infectieux. Consultez l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produit affichée sur le site [streck.com](#) pour connaître les tests sanguins spécifiques exigés par la FDA.
- Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ordinaires, mais avec les déchets médicaux infectieux. Une élimination par incinération est recommandée.
- Ce produit doit être utilisé tel qu'il a été fourni. L'adulteration par addition d'un matériel quelconque au produit tel que fourni lui enlèvera toute valeur diagnostique. Exception : si un contrôle Niveau 2 est dilué comme indiqué en 3.a., sous Mode d'emploi.
- Les fiches techniques peuvent être obtenues sur le site [streck.com](#), en appelant le +1 402 691 7510 ou en appelant votre fournisseur local.

CONSERVATION ET STABILITÉ

Le contrôle de fluide corporel Cell-Chex est stable jusqu'à la date de péremption lorsqu'il est conservé entre 2 et 10 °C. Après ouverture, Cell-Chex reste stable jusqu'à la date limite après ouverture du flacon, indiquée sur la feuille de dosage, à condition d'être conservé entre 2 et 10 °C.

INDICATION DE DÉTÉRIORATION DU PRODUIT

L'impossibilité d'obtention des valeurs escomptées pour les numérations cellulaires totales ou de différenciation des types de cellules peut indiquer une détérioration du produit. Si les valeurs obtenues ne se situent pas dans les intervalles escomptés :

- Lire les sections Mode d'emploi et Restrictions de la notice d'utilisation du produit de contrôle.
- Vérifier la date de péremption de Cell-Chex. Jeter les produits périmés.
- Doser un flacon non ouvert de Cell-Chex. Si les valeurs se situent toujours hors de l'intervalle escompté, appeler le Service technique de Streck au +1 402-691-7510 ou le contacter en ligne sur le site [technicalservices@streck.com](#).

MODE D'EMPLOI

- Retirer les contrôles du réfrigérateur. Il est inutile de porter les contrôles à température ambiante avant usage.


2. Pour mélanger : (ne pas mélanger mécaniquement ou passer au vortex.)

Pour visionner une démonstration, consulter [streck.com/mixing](#).

- Tenir le flacon à la verticale entre les paumes des mains et le rouler entre les mains pendant 15 à 20 secondes.



- Continuer de mélanger en tenant le flacon entre le pouce et l'index : retourner vite le flacon 20 fois par rotation rapide du poignet.



- Analyser immédiatement après le mélange. Des analyses supplémentaires peuvent être effectuées au cours de cette période de test en inversant le flacon 5 fois avant l'échantillonage.

- Les étapes à a à c doivent être répétées lors du retrait de l'échantillon du réfrigérateur pendant toute la période durant laquelle le flacon est ouvert.

French (Français)

- Les échantillons doivent être prélevés à l'aide d'un tube capillaire ou d'un embout de pipette propre. Le flacon doit être refermé juste après le prélèvement. Prendre soin d'empêcher une contamination croisée du contrôle.
- En ce qui concerne les numérations par hémocytomètre, consulter la notice de l'hémocytomètre pour obtenir des instructions spécifiques. Le contrôle Niveau 2 est suffisamment concentré pour permettre une dilution et obtenir une valeur communicable.
- Si Cell-Chex est utilisé pour le contrôle du fluide synovial et l'analyse des cristaux, on peut réaliser l'évaluation des cristaux d'un contrôle positif à l'aide d'une microscopie en lumière polarisée ou en suivant le protocole d'analyse du fluide synovial du laboratoire en place.
- Pour les numérations différentielles de globules blancs, préparer un frottis Cytospin selon le mode opératoire du laboratoire. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser 250 µl de produit de contrôle. **L'addition de tout matériel à Cell-Chex avant la préparation d'un frottis n'est ni nécessaire, ni recommandée.** Colorer le frottis Cytospin de Cell-Chex selon le mode opératoire du laboratoire pour les analyses hématologiques de routine. **La préparation différentielle utilisée pour obtenir les valeurs de dosage Cell-Chex est centrifugée pendant 7 minutes à 500 tr/min.**
- Après le prélèvement, remettre au réfrigérateur pour assurer la stabilité maximale du flacon ouvert. Essuyer les filets du flacon et du bouchon, puis refermer et remettre au réfrigérateur.

RESTRICTIONS

- L'analyse de Cell-Chex est impossible sur un analyseur d'hématologie automatique. Le processus de stabilisation des globules rouges interfère avec la numération des globules blancs.
- Les globules blancs Cell-Chex sont stabilisés. Le traitement préalable de Cell-Chex avant la préparation d'un frottis de Cytospin est inutile.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

Les valeurs assignées pour les globules rouges, les globules blancs et les valeurs différentielles ont été déterminées par des numérations en parallèle à l'hémocytomètre et aux frottis Cytospin colorés. Les valeurs de numérations cellulaires totales assignées sont basées sur le nombre moyen de cellules par µl compté dans les neuf grands carrés des deux côtés de la chambre de numération de l'hémocytomètre amélioré de Neubauer. Les valeurs de numérations cellulaires différentielles assignées sont basées sur les différentiels de 100 cellules en parallèle. Les valeurs d'intervalle de dosage ont été établies sur la base de +/- 3 écarts-types pour les paramètres différentiels globules blancs et de +/- 2 écarts-types pour les paramètres globules blancs et globules rouges. Selon les bonnes pratiques de laboratoire, tout laboratoire individuel doit établir ses propres moyennes et limites pour chaque paramètre dès réception d'un nouveau lot de contrôle. Toutefois, les moyennes de contrôle établies par le laboratoire doivent demeurer dans la fourchette prévue telle que spécifiée pour le témoin.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Les valeurs de composant cellulaire assignées sont présentées sous forme de moyenne et d'intervalle de recouvrement. Les valeurs de dosage de composant cellulaire moyennes sont dérivées de tests répétitifs sur plusieurs flacons de produit en utilisant des hémocytomètres améliorés de Neubauer, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. Les valeurs de dosage cellulaire différentiel globules blancs ont été déterminées en évaluant les frottis Cytospin répétitifs de différentes séries de flacons selon les instructions du fabricant. Les cristaux sont identifiés comme étant « présents » ou « absents », n'ont pas d'intervalle de recouvrement et sont déterminés visuellement à l'aide d'hémocytomètres sur des flacons représentatifs. Comme les intervalles de recouvrement pour composants cellulaires sont destinés à refléter la variabilité inter-laboratoires, ils se situent à +/- 3 écarts-types pour les paramètres différentiels globules blancs et +/- 2 écarts-types pour les paramètres globules blancs et globules rouges. Toujours effectuer un contrôle qualité conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, aux exigences du directeur du laboratoire et à toute exigence de réglementation ou d'accréditation.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Streck propose STATS®, un programme de contrôle de qualité interlaboratoires qui est offert gratuitement à tous les clients. Pour obtenir plus d'informations, contacter le service STATS au +1 402-691-7495 ou envoyer un message à l'adresse courriel [statsdata@streck.com](#). Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site [streck.com](#).

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

Pour toute assistance, contacter le service clientèle au +1 402-333-1982. Pour plus d'informations, consulter le site [streck.com](#).

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Consulter l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produit affichée sur le site [streck.com](#).

Consulter le site [streck.com/patents](#) pour les brevets qui pourraient concerner ce produit.



Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA



MediMape® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350468-16
2020-04

GEBRAUCHSANLEITUNG

VERWENDUNGSZWECK

Cell-Chex® ist eine getestete Kontrolle zur Überwachung von Gesamtzellzählungen, die manuell mit einem Hämocytometer durchgeführt werden, um die Quantifizierung der roten und weißen Blutkörperchen in den Zerebrospinal- und anderen Körperflüssigkeiten, einschließlich Pleura-, Perikardial- und Synovialflüssigkeiten, zu validieren. Pegel-1-UC enthält Natriumuratkristalle und Pegel-1-CC enthält Calciumpyrophosphatdihydrat (CPPD)-Kristalle, die zur Überwachung des Vorhandenseins von Kristallen in Gelenksflüssigkeit verwendet werden können.

Cell-Chex ist weiterhin zur Überwachung der Leukozyten-Differenzierung (mononuklear und polymorphonuklear; Neutrophile, Eosinophile, Basophile, Lymphozyten und Monozyten) in Körperflüssigkeitsproben aus Cytospin-Ausstrichen vorgesehen.

ZUSAMMENFASSUNG UND GRUNDLAGEN

Die mikroskopische Untersuchung der Zerebrospinal- und anderer Körperflüssigkeiten ist ein wichtiger Teil der routinemäßigen Analyse von Körperflüssigkeitsproben. Das Gesamtblutbild, die Kristallerkennung und die Differentialzählung der weißen Blutkörperchen vermitteln wichtige Informationen über Infektionen, Hämmorrhagen, Malignitäts- und Entzündungszustände und Reizung der Gelenkkäume. Die Gesamtzellzählungen und Kristallerkennung werden mit einem Hämocytometer an unverdünnter oder verdünnter Körperflüssigkeit durchgeführt. Die Kristallanalyse kann anhand von Lichtmikroskopie oder polarisierter Lichtmikroskopie im Anschluss an ein routinemäßiges Laborprotokoll für Kristallerkennung durchgeführt werden. Differentialzählungen von Körperflüssigkeiten werden an Cytospin-Ausstrichen durchgeführt, die mit hämatologischen Färbetechniken präpariert wurden.

Wenn die Cell-Chex Körperflüssigkeitskontrolle wie eine Patientenprobe gehandhabt wird, liefert sie Gesamt- und Differentialzellzählungen, die innerhalb der auf dem Testblatt angegebenen, erwarteten Bereiche liegen.

REAGENZIEN

Die Cell-Chex Körperflüssigkeitskontrolle enthält stabilisierte humane rote Blutkörperchen, humane weiße Blutkörperchen, Natriumuratkristalle (nur Pegel-1-UC) und CPPD-Kristalle (nur Pegel-1-CC) in Konservierungsmittel.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Für den diagnostischen In-vitro-Gebrauch.
2. ACHTUNG: Blutprodukte sind stets als mögliche Infektionsquellen zu behandeln. Das Ausgangsmaterial, aus dem dieses Produkt gewonnen wurde, wurde mit den derzeit von der FDA vorgeschriebenen Tests untersucht und für negativ befunden. Keine der bekannten Testmethoden kann mit Sicherheit garantieren, dass aus Humanblut gewonnene Produkte keine Infektionserreger übertragen. Spezifische von der FDA vorgeschriebene Blutuntersuchungen finden Sie unter „Resources“ (Ressourcen) auf der Registerkarte „Instructions (IFU)“ (Anweisungen) der Produktseite unter [streck.com](#).
3. Dieses Produkt sollte nicht mit dem allgemeinen Müll, sondern als infektiöser medizinischer Abfall entsorgt werden. Es wird eine Entsorgung durch Verbrennen empfohlen.
4. Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen. Wird das Produkt durch Zusatz irgendeines anderen Stoffes verändert, ist es untauglich für die beabsichtigten diagnostischen Zwecke. Ausnahme: Verdünnung der Kontrolle Level 2 wie unter 3.a., Gebrauchsanleitung, beschrieben.
5. Sicherheitsdatenblätter sind unter [streck.com](#), telefonisch unter +1-402-691-7510 oder bei Ihrem örtlichen Lieferanten erhältlich.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Bei 2 bis 10 °C bleibt die Cell-Chex-Körperflüssigkeitskontrolle bis einschließlich des Verfallsdatums stabil. Nach dem Anbrechen bleibt das Produkt bis einschließlich des Verfallsdatums für das angebrochene Fläschchen stabil (siehe Analyseblatt), sofern es bei 2 bis 10 °C gelagert wird.

ANZEICHEN EINER QUALITÄTSVERSCHLECHTERUNG

Unfähigkeit, die erwarteten Werte für die Gesamtzellzählungen zu erhalten oder die Zellarten zu differenzieren, ist ein Anzeichen einer möglichen Produktverschlechterung. Falls die gemessenen Werte nicht im erwarteten Bereich liegen:

1. Überprüfen Sie in der Packungsbeilage des Kontrollprodukts die Abschnitte Bedienungsanleitung und Einschränkungen.
2. Prüfen Sie das Verfallsdatum der Cell-Chex-Kontrolle. Entsorgen Sie Produkte, deren Verfallsdatum überschritten ist.
3. Analysieren Sie ein ungeöffnetes Fläschchen Cell-Chex. Liegen die Werte noch immer außerhalb des erwarteten Bereichs, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Streck unter der Nummer +1 402-691-7510 oder online an [technicalservices@streck.com](#).

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Kontrollen aus dem Kühlschrank nehmen. Sie müssen vor der Verwendung nicht auf Zimmertemperatur erwärmt werden.
2. Mischen: (**NICHT mechanisch oder mit Vortex mischen.**)

Eine Video-Vorführung ist auf [streck.com/mixing](#) verfügbar.

- a. Das Fläschchen senkrecht halten und jedes einzelne Fläschchen 15–20 Sekunden lang zwischen den Handflächen hin und her rollen.



- b. Das Fläschchen zwischen Daumen und Finger fassen und weiter mischen; das Fläschchen dazu in rascher Folge 20mal mit sehr scharfer Bewegung aus dem Handgelenk heraus über Kopf drehen.



German (Deutsch)

- c. Unmittelbar nach dem Mischen analysieren. Weitere Analysen im Rahmen dieses Testzeitraums sind nach 5-maligem Überkopfdrehen des Fläschchens vor der Probennahme möglich.
- d. Die Schritte a-c sind nach der Entnahme der Probe aus dem Kühlschrank im Laufe des gesamten Zeitraums, in dem das Fläschchen offen ist, zu wiederholen.
3. Die Cell-Chex Kontrollen in gleicher Weise wie eine Patientenprobe benutzen. Proben müssen mit einem/r sauberen Kapillarpipette bzw. Pipettenspitze entnommen werden. Das Fläschchen nach Abschluss der Probennahme sofort verschließen. Eine Kreuzkontaminierung der Kontrolle sollte unbedingt vermieden werden.
 - a. Für Hämocytometerzählungen entnehmen Sie spezifische Anweisungen Ihrer Hämocytometer-Packungsbeilage. Die Kontrolle Level 2 ist stark genug konzentriert, so dass eine Verdünnung durchgeführt werden kann, die einen berichtbaren Wert ergibt.
 - b. Bei Verwendung von Cell-Chex zur Synovialflüssigkeitskontrolle und Kristallanalyse können weitere Kristallbeurteilungen anhand von polarisierter Lichtmikroskopie oder durch Befolgen eines festgelegten Laborprotokolls für die Synovialflüssigkeitsanalyse durchgeführt werden.
 - c. Für Differentialzählungen weißer Blutkörperchen unter Einhaltung der im Labor geltenden Verfahrensweise einen Cytospin-Ausstrich präparieren. Die besten Ergebnisse werden mit 250 µL Kontrollprodukt erzielt. Der **Zusatz irgendwelcher Stoffe zum Cell-Chex vor der Ausstrichpräparation ist weder notwendig noch empfehlenswert**. Dem Cytospin-Ausstrich der Cell-Chex Kontrolle entsprechend der im Labor üblichen Verfahrensweise farben. **Das zur Bestimmung der Cell-Chex-Assaywerte dienende Differentialpräparat wird 7 Minuten lang bei 500 RPMs zentrifugiert.**
4. Nach der Probennahme das angebrochene Fläschchen zur Sicherstellung der optimalen Haltbarkeit in den Kühlschrank zurückstellen. Das Gewinde sowohl am Fläschchen als auch an der Verschlusskappe abwischen, dann verschließen und in den Kühlschrank zurückstellen.

EINSCHRÄNKUNGEN

1. Die Cell-Chex-Analyse kann nicht auf einem automatisierten Hämatologieanalysator durchgeführt werden. Der Stabilisierungsprozess der roten Blutkörperchen würde sich auf die Leu-Zählung störend auswirken.
2. Die weißen Blutkörperchen von Cell-Chex sind stabilisiert. Eine Vorbereitung von Cell-Chex vor der Präparation eines Cytospin-Ausstrichs ist nicht nötig.

ERWARTETE ERGEBNISSE

Die zugewiesenen Werte für rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Differentialwerte wurden durch Replikationsanalysen von Hämocytometer-Zählungen und gefärbten Cytospin-Ausstrichen bestimmt. Die zugewiesenen Werte der Gesamtzellzählungen beruhen auf der durchschnittlichen Anzahl von Zellen pro µL, die in den neu großen Rastervierecken an beiden Seiten der Neubauer Improved-Hämocytometer-Zählungskammer berechnet wurden. Die zugewiesenen Werte der Differentialzellzählungen beruhen auf replizierten 100-Zelldifferentialen. Die Testbereichswerte wurde aufgrund +/- 3SD für LEU-Differentialparameter und +/- 2SD für die ERY- und LEU-Parameter festgelegt. Bei Erhalt einer neuen Kontrollcharge erfordert die gute Laborpraxis, dass das betreffende Labor für jeden Parameter seine eigenen Mittel- und Grenzwerte etabliert. Der vom Labor bestimmte Mittelwert sollte jedoch innerhalb des für die jeweilige Kontrolle festgelegten erwarteten Bereichs liegen.

LEISTUNGSMERKMALE

Die zugewiesenen Zellkomponentenwerte werden als Mittelwert- und Wiederherstellungsbereich präsentiert. Die mittleren Zellkomponenten-Testwerte werden aus wiederholten Tests abgeleitet, die an mehreren Produktfläschchen anhand der Neubauer Improved-Hämocytometer durchgeführt werden. Letztere werden gemäß den Herstelleranweisungen betrieben und gewertet. Die Differentialzellwerte der weißen Blutkörperchen werden durch Beurteilung wiederholter Cytospin-Ausstriche aus verschiedenen Fläschchen gemäß den Herstelleranweisungen ermittelt. Kristalle werden als „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“ identifiziert, haben keinen Wiederherstellungsbereich und werden visuell anhand von Hämocytometern bei repräsentativen Fläschchen ermittelt. Die Wiederherstellungsbereiche für Zellkomponenten sind dafür vorgesehen, die Laborvariabilitäten aufzuzeigen. Sie liegen somit im Bereich +/- 3SD für LEU-Differentialparameter und +/- 2SD für die ERY- und LEU-Parameter. Die Qualitätskontrolle sollte stets gemäß guten Laborpraktiken, gemäß den Anforderungen des Laborleiters und jeglichen behördlichen oder anerkannten Vorschriften erfolgen.

PROGRAMM ZUR QUALITÄTSSICHERUNG

Streck stellt allen Kunden kostenlos das Interlabor-Qualitätskontrollprogramm **STATS®** zur Verfügung. Näheres erfahren Sie bei der **STATS**-Abteilung unter +1 402-691-7495 oder [statsdata@streck.com](#). Zusätzliche Informationen sind online bei [streck.com](#) erhältlich.

BESTELLINFORMATIONEN

Unterstützung bietet unsere Kundendienstabteilung unter der Rufnummer +1 402-333-1982. Zusätzliche Informationen sind online unter [streck.com](#) erhältlich.

SYMBOLISTE

Beachten Sie bitte die Registerkarte Anweisungen (IFU) unter Ressourcen auf der Produktseite unter [streck.com](#).

Eventuell auf dieses Produkt zutreffende Patente finden Sie unter [streck.com/patents](#).

 Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350468-16
2020-04

ISTRUZIONI PER L'USO**USO PREVISTO**

Cell-Chex® è un controllo testato destinato al monitoraggio delle conte cellulari totali eseguite manualmente con l'ausilio di un emocitometro, allo scopo di validare la quantificazione di eritrociti e leucociti nei campioni clinici di liquor cerebrospinale e liquidi corporei, inclusi liquido pleurico, pericardico, peritoneale e sinoviale. Il Livello 1-UC contiene cristalli di urato monosodico e il livello 1-CC contiene cristalli di calcio pirofosfato diidrato (CPPD), che possono essere usati per monitorare la presenza di cristalli nel liquido sinoviale.

Cell-Chex è inoltre destinato al monitoraggio della formula leucocitaria (mononucleari e polymorfonucleari: neutrofili, eosinofili, basofili, linfociti e monociti) nei campioni di liquidi corporei analizzati utilizzando strisci Cytospin.

SOMMARIO E PRINCIPI

La valutazione microscopica del liquor cerebrospinale e di altri liquidi corporei è una componente importante delle analisi di routine dei campioni di liquidi corporei. La conta cellulare totale, l'identificazione di cristalli e la formula leucocitaria possono fornire informazioni preziose relative a infezioni, emorragie, tumori maligni, condizioni infiammatorie e irritazione degli spazi articolari. Le conte cellulari totali e l'identificazione di cristalli sono eseguite con un emocitometro, usando liquido corporeo diluito o non diluito. L'analisi dei cristalli può essere eseguita usando luce o microscopia a luce polarizzata secondo il protocollo di routine del laboratorio per l'identificazione di cristalli. Le formule leucocitarie di liquidi corporei sono eseguite usando strisci Cytospin colorati mediante tecniche di colorazione ematologica di routine.

Allorché trattato come un campione prelevato da un paziente, il controllo dei liquidi corporei Cell-Chex fornisce conte cellulari totali e formule leucocitarie entro i range attesi indicati nella scheda di analisi.

REAGENTI

Il controllo dei fluidi corporei Cell-Chex contiene leucociti e eritrociti umani stabilizzati, cristalli di urato monosodico (Livello 1-UC soltanto) e cristalli di CPPD (Livello 1-CC soltanto) in un mezzo conservante.

PRECAUZIONI

- Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.
- ATTENZIONE** - Tutti gli emoderivati devono essere trattati come se fossero infettivi. Il materiale di origine dal quale questo prodotto è stato derivato è risultato negativo ai test attualmente richiesti dalla FDA. Nessun metodo di analisi conosciuto è in grado di garantire che i prodotti derivati dal sangue umano non trasmettano agenti infettivi. Per gli esami del sangue specifici richiesti dalla FDA, consultare la scheda Istruzioni (IFU) sotto Risorse nella pagina del prodotto sul sito [streck.com](#).
- Questo prodotto non deve essere smaltito nei normali rifiuti, ma insieme ai rifiuti medici infetti. Si raccomanda lo smaltimento mediante incenerimento.
- Questo prodotto è destinato all'uso così come fornito. L'adulterazione mediante integrazione di qualsiasi materiale nel prodotto così come fornito, ne invalida qualunque uso diagnostico. Eccezione: se il controllo di Livello è diluito come indicato nel punto 3.a. della sezione Istruzioni per l'uso.
- Le SDS possono essere reperite nel sito web [streck.com](#), richieste telefonicamente al numero +1 402-691-7510 o al fornitore di zona.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Il controllo del liquido corporeo Cell-Chex è stabile fino alla data di scadenza, purché conservato ad una temperatura compresa fra 2 e 10 °C. Una volta aperto, Cell-Chex è stabile fino alla data di scadenza per la fiala aperta indicata nella scheda di analisi, purché conservato ad una temperatura compresa fra 2 e 10 °C.

INDICAZIONE DI DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO

L'impossibilità di ottenere i valori attesi per le conte cellulari totali o di differenziare i tipi cellulari può essere indice di deterioramento del prodotto. Se i valori ottenuti non rientrano nei range attesi:


- Rivedere le sezioni Istruzioni per l'uso e Limitazioni riportate nel foglietto illustrativo del prodotto di controllo.
- Controllare la data di scadenza di Cell-Chex. Gettare il prodotto scaduto.
- Analizzare una fiala sigillata di Cell-Chex. Se i valori sono ancora al di fuori dell'intervallo previsto, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Streck al numero +1 402-691-7510 oppure visitare il sito [technicalservices@streck.com](#).

ISTRUZIONI PER L'USO

- Estrarre i controlli dal frigorifero. Non è necessario portare i controlli a temperatura ambiente prima dell'uso.
- Per miscelare: **(NON miscelare meccanicamente o vortexare.)**

Per una dimostrazione video, andare a [streck.com/mixing](#).

- Tenere la fiala in posizione verticale e farla rotolare in avanti e all'indietro fra i palmi delle mani per 15-20 secondi.



- Continuare a miscelare tenendo la fiala dalle estremità fra il pollice e l'indice, capovolgendola 20 volte rapidamente e completamente con un movimento rotatorio molto rapido del polso.



- Analizzare immediatamente dopo aver miscelato. Per eseguire altre analisi durante questo periodo di test capovolgere 5 volte la fiala prima del campionamento.
- Ripetere i passaggi a-c dopo aver tolto il campione dal frigorifero per l'intero periodo in cui la fiala rimane aperta.

Italian (Italiano)

- Usare i controlli Cell-Chex come se fossero campioni clinici. Prelevare i campioni usando un puntale di pipetta o un capillare puliti. Chiudere la fiala subito dopo il campionamento. Prestare attenzione ad evitare la contaminazione crociata del controllo.
- Per le istruzioni specifiche sulle conte emocitometriche, fare riferimento all'inserto della confezione dell'emocitometro. Il controllo di Livello 2 è concentrato in misura sufficiente a consentire l'esecuzione di una diluizione e ottenere un valore refertabile.
- Se si usa Cell-Chex per il controllo del liquido sinoviale e l'analisi dei cristalli, si può eseguire un'ulteriore valutazione dei cristalli di controllo positivo usando microscopia a luce polarizzata o seguendo un protocollo di laboratorio riconosciuto per l'analisi del liquido sinoviale.
- Per le conte di differenziale leucocitario, preparare uno striscio Cytospin secondo il protocollo di laboratorio riconosciuto. Per ottenere risultati ottimali, usare 250 µL di prodotto del controllo. **Non è necessario, né raccomandato, aggiungere alcun materiale a Cell-Chex prima della preparazione di uno striscio.** Colorare lo striscio di Cell-Chex secondo il protocollo di laboratorio riconosciuto per i test ematologici di routine. **La preparazione differenziale usata per ottenere i valori di analisi Cell-Chex è centrifugata per 7 minuti a 500 giri/min.**

- Dopo il campionamento, riporre in frigorifero al fine di garantire la massima stabilità della fiala aperta. Asciugare le filettature della fiala e del cappuccio prima di riporre il cappuccio e rimettere la fiala in frigorifero.

LIMITAZIONI

- L'analisi di Cell-Chex non può essere eseguita su un analizzatore ematologico automatico. A causa del processo di stabilizzazione, gli eritrociti interferiscono con la conta leucocitaria.
- I leucociti Cell-Chex sono stabilizzati. Non è necessario pretrattare Cell-Chex prima della preparazione di uno striscio Cytospin.

RISULTATI ATTESI

I valori assegnati relativi a eritrociti e leucociti e i valori differenziali sono stati determinati mediante analisi replicate delle conte emocitometriche e degli strisci Cytospin colorati. I valori assegnati delle conte cellulari totali si basano sul numero medio di cellule per µl contate nei nove grandi quadrati della griglia su entrambi i lati della camera di conta dell'emocitometro di Neubauer modificato. I valori assegnati delle formule leucocitarie si basano su differenziali replicati di 100 cellule. I valori che rientrano nell'intervallo di analisi sono basati su +/- 3 DS per i parametri di WBC differenziali e +/- 2 DS per i parametri RBC e WBC. Non appena si riceve un nuovo lotto di controllo, è una buona pratica di laboratorio che ciascun laboratorio stabilisca i propri limiti e le proprie medie per ogni parametro. Tuttavia, i valori medi di controllo stabiliti dal laboratorio devono essere compresi nell'intervallo previsto specificato per il controllo stesso.

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

I valori assegnati dei componenti cellulari sono presentati come media e come intervallo di recupero. I valori medi di analisi dei componenti cellulari sono derivati da test ripetuti su fiale multiple di prodotto usando emocitometri di Neubauer modificati, fatti funzionare e mantenuti secondo le istruzioni del produttore. I valori di analisi della formula leucocitaria sono stati determinati valutando strisci Cytospin ripetuti da fiale diverse analizzate secondo le istruzioni del produttore. I cristalli sono identificati come "presenti" o "non presenti", non hanno un intervallo di recupero e vengono determinati visivamente usando emocitometri su fiale rappresentative. Gli intervalli di recupero per i componenti cellulari servono a riflettere la variabilità dei laboratori, quindi si trovano entro +/- 3 DS per i parametri di WBC differenziali e +/- 2 DS per i parametri RBC e WBC. Eseguire sempre il controllo della qualità secondo le buone pratiche di laboratorio, i requisiti del direttore del laboratorio e qualsiasi requisito di accreditamento o normativo.

PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITÀ

Streck offre in omaggio a tutti i clienti STATS®, un programma interlaboratorio di controllo qualità. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al reparto STATS al numero +1 402-691-7495 oppure inviare una e-mail all'indirizzo [statsdata@streck.com](#). Altre informazioni sono disponibili nel sito Web [streck.com](#).

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Per assistenza rivolgersi al reparto Servizio di Assistenza ai Clienti al numero +1 402-333-1982. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web [streck.com](#).

GLOSSARIO DEI SIMBOLI

Vedere la scheda Instructions (Istruzioni) (IFU) in Resources (Risorse) sulla pagina del prodotto all'indirizzo [streck.com](#).

Vedere [streck.com/patents](#) per i brevetti che potrebbero essere applicabili a questo prodotto.

 Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP
MEDIMARK® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350468-16
2020-04

BRUKSANVISNING**TILTENKT BRUK**

Cell-Chex® er en analysekontroll til overvåking av total cellestelling som utføres manuelt ved hjelp av et hemacytometer for å vurdere tellingen av røde og hvite blodlegemer i pasientprøver av cerebrospinalvæske og kroppsvæske, deriblant pleural-, perikardial- peritoneal- og synovalvæske. Nivå 1-UC inneholder monosodium uratkristaller, og nivå 1-CC inneholder kaliumpyrofosfatdihydratkristaller (CPPD-kristaller) som kan brukes til å overvåke hvorvidt kristaller er tilstede i leddvæske.

Cell-Chex er også tiltent bruk til overvåking av differensiering av hvite blodlegemer (mononukleære og polymorfnukleære, nøytrøfiler, eosinøfiler, basofiler, lymfocyter og monocytter) i kroppsvæskeprøver utført med Cytospin-utstryk.

SAMMENDRAG OG PRINSIPPER

Mikroskopisk vurdering av cerebrospinalvæske og andre kroppsvæske er en viktig del av rutineanalyser av kroppsvæskeprøver. Totalt celleantall, identifisering av kristaller og differensialstelling av hvite blodlegemer kan gi verdifulle informasjoner om infeksjoner, blodninger, ondartethet, inflamatoriske forhold og irritasjon av leddrom. Totalt celleantall og identifisering av kristaller utføres med et hemacytometer med ufortynnet eller fortynnet kroppsvæske. Kristallanalyse kan utføres med lysmikroskop med eller uten polarisert lys i henhold til vanlig laboratorieprotokoll for identifisering av kristaller. Differensialcellestelling av kroppsvæske utføres med Cytospin-utstryk som er farget etter fargemetode for rutinehematologi.

Når Cell-Chex kroppsvæskekontroll behandles som en pasientprøve, vil enheten angi totalt celleantall og differensialcellestellingen innenfor de forventede verdiområdene anført på analysearket.

REAGENSER

Cell-Chex kroppsvæskekontroll inneholder stabiliserte røde og hvite blodlegemer fra mennesker, monosodium uratkristaller (kun nivå 1-UC) og CPPD-kristaller (kun nivå 1-CC) i et konserveringsmiddel.

FORHOLDSREGLER

1. Til diagnostisk bruk in vitro.
2. NB! Alle blodprodukter bør behandles som potensielt smittsomme. Kildemateriale som dette produktet ble avledet fra, både funnet å være negativt når testet i henhold til gjeldende FDA-påbude tester. Ingen kjente testmetoder kan tilby forsikring om at produkter avledet fra humant blod ikke vil overføre smittestoff. Se Bruksanvisning-fanen under Ressurser på produktsiden på streck.com for spesifikke blodprøver som kreves av FDA.
3. Produktet skal ikke kasseres sammen med alminnelig avfall, men avhendes som smittsamt medisinsk avfall. Forbrenning av avfallet anbefales.
4. Produktet skal brukes slik det leveres. Vareførfalskning ved tilsetting av ethvert materiale til produktet slik det leveres, ugyldiggjør all diagnostisk bruk av produktet. Unntak: Ved nivå 2 fortynnes kontrollen som angitt i punkt 3a i bruksanvisningen.
5. Sikkerhetsdatablad kan fås fra streck.com, ved å ringe +1 402-691-7510 eller ved å ringe til din lokale leverandør.

OPPBEBARING OG STABILITET

Cell-Chex kroppsvæskekontroll er stabil til og med utløpsdatoen når den oppbevares ved 2–10 °C. Etter åpning er produktet stabilt til og med utløpsdatoen for åpen ampulle som angitt på analysearket når det oppbevares ved 2–10 °C.

INDIKASJON PÅ PRODUKTFORRINGELSE

Dersom forventede verdier for totalt celleantall ikke kan oppnås eller celletypene ikke kan differensieres, kan det være tegn på produktforringelse. Gjør følgende hvis de oppnådde verdiene ikke ligger innenfor forventede verdiområder:

1. Les bruksanvisningen og begrensningene på kontrollprodukts pakningsvedlegg.
2. Sjekk utløpsdatoen for Cell-Chex. Kasser produkter som er gått ut på dato.
3. Analyser en uåpnet Cell-Chex-ampulle. Hvis verdien fremdeles ligger utenfor det forventede verdiområdet, ta kontakt med Streck teknisk service på +1 402-691-7510 eller på Internett på technicalservices@streck.com.

BRUKSANVISNING

1. Ta kontrollene ut av kjøleskapet. Det er ikke nødvendig å varme opp kontrollene til romtemperatur før bruk.
2. For å blande: (**Skal IKKE blandes mekanisk eller ved virveling.**)
For en video demonstrasjon, gå til streck.com/mixing.

a. Hold hetteglasset loddrett og rull hvert hetteglass mellom håndflatene i 15-20 sekunder.



b. Fortsett å blande ved å holde hetteglasset i endene mellom tommelen og fingeren, snu hetteglasset raskt 20 ganger fra ende til ende med en hurtig dreiebevegelse av håndleddet.



- c. Analyser umiddelbart etter blanding. Senere analyser i løpet av denne testperioden kan utføres ved å snu hetteglasset opp ned 5 ganger før prøvetaking.
- d. Trinn a-c må gjentas når prøven tas ut av kjøleskapet i hele tidsperioden med åpent hetteglass.
3. Bruk Cell-Chex-kontrollene på samme måte som en pasientprøve. Prøvene skal tas ved hjelp av rent kapillarrør eller pipette. Ampullen skal lukkes umiddelbart etter at prøven er tatt. Det må utvises forsiktighet for å unngå krysskontaminering av kontrollen.

a. Se hemacytometerets pakningsvedlegg om spesifikke instruksjoner for hemacytometertelling.

Kontrollen for nivå 2 er konservert nok til å fortynnes og gi en rapporterbar verdi.

Norwegian (Norsk)

- b. Dersom det brukes Cell-Chex til kontroll av synovalvæske og krystallanalyse, kan ytterligere krystallevaluering av en positiv kontroll utføres med polarisert lysmikroskop, eller ved å følge etablert laboratorieprotokoll for analyse av synovalvæske.
- c. For differensialstelling av hvite blodlegemer, tilbered et Cytospin-utstryk ifølge standard laboratorieprosedyrer. Bruk 250 µL kontrollprodukt for best resultat. **Tilsetting av ethvert materiale til Cell-Chex før tilberedelse av utstryket er ikke nødvendig og anbefales ikke.** Farg Cytospin-utstryket av Cell-Chex ifølge standard laboratorieprosedyrer for rutinehematologi. **Differensialpreparatet som brukes til å oppnå Cell-Chex-analyseverdier skal centrifugeres i 7 minutter ved 500 opm.**
4. Sett ampullen tilbake til kjøling etter prøvetaking for maksimal stabilitet for åpenet ampulle. Tørk av gjengene både på ampullen og hetten før hetten settes på igjen og ampullen settes til kjøling.

BEGRENNSNINGER

1. Cell-Chex-analyser kan ikke utføres på automatiserte hematologianalysatorer. Stabiliseringss prosessen for de røde blodlegemene vil ha innvirkning på tellingen av hvite blodlegemer.
2. De hvite blodlegemene i Cell-Chex er stabilisert. Det er ikke nødvendig å forhåndsbehandle Cell-Chex før forberedelse av Cytospin-utstryk.

FORVENTEDE RESULTATER

De tilordnede verdiene for røde blodlegemer, hvite blodlegemer og differensialverdier ble fastsatt ved hjelp av duplikatanalyser av hemacytometertelling og fargeide Cytospin-utstryk. De tilordnede verdiene for totale celleantall er basert på gjennomsnittlig antall celler per µL oppfelt i de ni store kvadratene i rutene på begge sider av Neubauer Improved hemacytometerets tellekammer. De tilordnede verdiene for differensialcellestellingen er basert på dupliserte 100-celledifferensialer. Analyseverdiområdet ble etablert basert på +/- 3SD for WBC-differensialparametre og +/- 2SD for RBC- og WBC-parametre. Ved mottakelse av et nytt parti med kontrollprodukt, anbefales det at hvert laboratorium fastsetter egne gjennomsnittsverdier og grenser for hver parameter. Gjennomsnittsverdien for kontrollen som laboratoriet har fastsatt, skal imidlertid være innenfor det forventede måleområdet som er angitt for kontrollen.

BRUKSEGENSKAPER

De tilordnede verdiene for cellekomponentene er gitt som et gjennomsnitt og et gjennopprettingsområde. Gjennomsnittlige analyseverdier for cellekomponenter er avledet fra gjentatte prøver på flere produktampuller med Neubauer Improved hemacytometer som er brukt og vedlikeholdt i henhold til produsentens instruksjoner. Analyseverdier for differensiering av hvite blodlegemer ble fastsatt ved å vurdere gjentatte Cytospin-utstryk fra forskjellige ampuller som ble kjørt i henhold til produsentens instruksjoner. Krystaller identifiseres som "tilstede/eværende" eller "fraværende", har ikke et gjennopprettingsområde og bestemmes visuelt med hemacytometer på representativt ampuller. Gjennopprettingsområdene for cellekomponenter er ment å reflektere laboratorievariabilitet. Følgelig ligger de innen +/- 3SD for WBC-differensialparametre og +/- 2 SD for RBC- og WBC-parametre. Utfor altid kvalitetskontroll i henhold til god laboratoriepraksis, laboratorelederens krav og ethvert krav i forordninger eller for akkreditering.

KVALITETSKONTROLLPROGRAM

Streck tilbyr STATS®, et kvalitetskontrollprogram for laboratorier, gratis til alle kunder. Ta kontakt med STATSAvdelingen på +1 402-691-7495 eller statsdata@streck.com for mer informasjon. Ytterligere informasjon finnes på Internett på streck.com.

BESTILLINGSINFORMASJON

Ring kundeserviceavdelingen på +1 402-333-1982 for hjelp. Ytterligere informasjon finnes på Internett på streck.com.

SYMBOLORDLISTE

Se IFU [bruksanvisninger]-fanen under Resources [ressurser] på produktsiden på streck.com.

Se streck.com/patents for patenter som kan gjelde for dette produktet.

 Streck
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

EC REP
MediMark® Europe
11, rue Emile Zola, BP 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France

350468-16
2020-04

INSTRUCCIONES DE USO**USO INDICADO**

Cell-Chex® es un control analizado que está diseñado para monitorizar el recuento celular total realizado manualmente con un hemocitómetro, a fin de validar la determinación cuantitativa de hematíes y leucocitos en muestras de líquido cefalorraquídeo y líquidos corporales de pacientes tales como líquido pleural, pericárdico, peritoneal y sinovial. El nivel 1-UC contiene cristales de urato monosódico y el nivel 1-CC contiene cristales de pirofosfato cálcico dihidrato, que se pueden utilizar para monitorear la presencia de cristales en el líquido sinovial.

Cell-Chex también está indicado para monitorizar la fórmula leucocitaria (mononuclear y polimorfonuclear; neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos) en muestras de líquidos corporales mediante frotis de Cytospin.

RESUMEN Y PRINCIPIOS

La evaluación microscópica del líquido cefalorraquídeo y otros líquidos corporales es parte importante de los análisis habituales de muestras de líquidos corporales. El recuento celular total, la identificación de cristales y la fórmula leucocitaria pueden aportar información valiosa sobre infecciones, hemorragias, neoplasias malignas, afecciones inflamatorias e irritación de los espacios articulares. Los recuentos celulares totales y la identificación de cristales se realizan con un hemocitómetro, usando líquidos corporales diluidos o no diluidos. El análisis de cristales puede realizarse con microscopía óptica o de luz polarizada, siguiendo protocolos de laboratorio habituales para la identificación de cristales. Las fórmulas leucocitarias de los líquidos corporales se obtienen mediante frotis de Cytospin teñidos con las técnicas de tinción hematológica habituales.

Cuando se maneja como una muestra de paciente, el control de líquidos corporales Cell-Chex proporciona recuentos celulares totales y fórmulas leucocitarias dentro de los intervalos previstos indicados en la hoja de ensayo.

REACTIVOS

El control de líquidos corporales Cell-Chex contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos humanos estabilizados, cristales de urato monosódico (únicamente el nivel 1-UC) y cristales de pirofosfato cálcico dihidrato (únicamente el nivel 1-CC) en un medio conservante.

PRECAUCIONES

1. Para uso diagnóstico in vitro.
2. ATENCIÓN: Todos los productos hemoderivados deben tratarse como productos potencialmente infecciosos. El material de origen del cual deriva este producto dio negativo cuando se lo analizó conforme a los análisis actuales requeridos por la FDA. No existen métodos de ensayo que puedan asegurar que los productos derivados de la sangre humana no transmitirán agentes infecciosos. Vea la pestaña de Instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto en [streck.com](#) para ver los análisis de sangre específicos requeridos por la FDA.
3. Este producto no debe desecharse con la basura común, sino con los residuos médicos infecciosos. Se recomienda eliminarlo por incineración.
4. Este producto está destinado a utilizarse tal como se entrega. La adulteración por adición de alguno de los materiales del producto entregado invalida todo uso diagnóstico del mismo. Excepción: Si el control de Nivel 2 se diluye según las indicaciones de 3.a. del apartado Instrucciones de uso.
5. Puede obtener hojas de datos de seguridad (SDS) por Internet en el sitio web [streck.com](#), llamando al +1 402-691-7510 o llamando al proveedor de su localidad.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El control de líquidos corporales Cell-Chex se mantiene estable hasta la fecha de vencimiento cuando se almacena a temperaturas entre 2 y 10 °C. Una vez abierto, Cell-Chex se mantiene estable hasta la fecha de vencimiento del vial abierto indicada en la hoja de información del ensayo si se almacena a temperaturas entre 2 y 10 °C.

INDICACIÓN DE DETERIORO DEL PRODUCTO

Si no es posible obtener los valores previstos del recuento celular total o diferenciar los tipos de células, esto puede deberse al deterioro del producto. Si los resultados de la prueba no están dentro de los intervalos previstos:

1. Consulte los apartados "Instrucciones de uso" y "Limitaciones" del prospecto del producto de control.
2. Verifique la fecha de vencimiento del Cell-Chex. Deseche los productos caducados.
3. Haga una prueba con un vial de Cell-Chex que no se haya abierto. Si los valores todavía se hallan fuera del intervalo previsto, comuníquese con el Servicio Técnico de Streck llamando al +1 402-691-7510 o en línea en el sitio [technicalservices@streck.com](#) de Internet.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Saque los controles del frigorífico. No es necesario esperar a que alcancen la temperatura ambiente antes de utilizarlos.
2. Para mezclar: (NO mezcle mecánicamente los materiales ni los agite por vórtex.)

Para ver una demostración en video, visite [streck.com/mixing](#).

- a. Sostenga cada vial verticalmente y ruédelo entre las palmas de las manos durante 15 a 20 segundos.



- b. Continúe mezclando; para ello sostenga el vial por los extremos entre el pulgar y otro dedo, inviértalo rápidamente 20 veces de un extremo a otro con un giro muy rápido de la muñeca.

**Spanish (Español)**

- c. Analice inmediatamente después de mezclar. Los análisis posteriores realizados durante este período de prueba pueden realizarse invirtiendo el vial 5 veces antes de efectuar el muestreo.
- d. Repita los pasos a-c después de retirar la muestra del refrigerador mientras dure el período de vial abierto.
3. Utilice el control Cell-Chex tal como usaría una muestra de paciente. Para extraer las muestras, utilice un tubo capilar o punta de pipeta limpios. Una vez finalizado el muestreo, debe cerrar el vial de inmediato. Deben tomarse las precauciones adecuadas para evitar la contaminación cruzada del control.
- a. Para recuentos del hemocitómetro, encontrará instrucciones específicas en el prospecto del mismo. La concentración del control de Nivel 2 es suficiente como para permitir realizar una dilución y obtener un valor comunicable.
- b. Si utiliza Cell-Chex para el control de líquidos pleural y el análisis de cristales, la evaluación posterior de cristales de un control positivo puede realizarse utilizando microscopía de luz polarizada o siguiendo protocolos de laboratorio establecidos para el análisis de líquido sinovial.
- c. Para fórmulas leucocitarias, prepare un frotis de Cytospin según el procedimiento de laboratorio establecido. Para obtener resultados óptimos, utilice 250 µl del producto de control. **No es necesario ni se recomienda añadir material alguno al Cell-Chex antes de la preparación de un frotis.** Tiña el frotis de Cytospin del Cell-Chex según el procedimiento de laboratorio establecido para los exámenes hematológicos habituales. **La preparación diferencial utilizada para obtener los valores de ensayo del Cell-Chex se centrifuga durante 7 minutos a 500 rpm.**

4. Despues del muestreo, vuelva a colocar el vial en el refrigerador para lograr la máxima estabilidad en vial abierto. Limpie las roscas del vial y de la tapa antes de volver a ponerle la tapa al vial y colocarlo de vuelta en el refrigerador.

LIMITACIONES

1. No es posible realizar el análisis del Cell-Chex en un analizador hematológico automatizado. El proceso de estabilización de los hematíes afectará la fórmula leucocitaria.
2. Los leucocitos del Cell-Chex están estabilizados. No es necesario hacer un tratamiento del Cell-Chex antes de la preparación de un frotis de Cytospin.

RESULTADOS PREVISTOS

Los valores asignados para hematíes, leucocitos y fórmulas leucocitarias se determinaron mediante análisis en paralelo de frotis de Cytospin teñidos y recuentos del hemocitómetro. Los valores asignados de los recuentos celulares totales se basan en el número promedio de células por µl contadas en los nueve grandes cuadrados reticulados en ambos lados de la cámara de recuento del hemocitómetro Neubauer mejorado. Los valores asignados de los recuentos celulares diferenciales se basan en diferenciales en paralelo de 100 células. Los valores del intervalo del ensayo se establecieron a partir de +/- 3 desviaciones estándares para los parámetros de fórmula leucocitaria y +/- 2 desviaciones estándares para los parámetros de hematíes y leucocitos. Al recibir un lote nuevo de control, las buenas prácticas de laboratorio recomiendan que cada laboratorio establezca para cada parámetro sus propios valores de media y límites. Sin embargo, los valores medios de control establecidos por el laboratorio deben encontrarse dentro del intervalo esperado que se especifica para el control.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Los valores de componentes celulares asignados se presentan como una media y un intervalo de recuperación. Los valores medios de ensayo de componentes celulares se derivan de pruebas repetidas en múltiples viales de producto utilizando los hemocitómetros Neubauer mejorados, que funcionan y reciben mantenimiento según las instrucciones del fabricante. Los valores de ensayo celular de fórmula leucocitaria se determinaron evaluando frotis repetidos de Cytospin de diferentes viales, analizados en seguimiento de las instrucciones del fabricante. Los cristales se identifican como "presentes" o "no presentes", no tienen un intervalo de recuperación y se determinan visualmente utilizando hemocitómetros en viales representativos. Los intervalos de recuperación para componentes celulares tienen el objetivo de representar la variabilidad de los laboratorios; por tal motivo, se encuentran dentro de +/- 3 desviaciones estándares para los parámetros de fórmula leucocitaria y +/- 2 desviaciones estándares para los parámetros de hematíes y leucocitos. Deben siempre realizarse pruebas de control de calidad en seguimiento de las normas de las prácticas óptimas de laboratorio, de las especificaciones establecidas por la gerencia del laboratorio y cualquier requisito de normativa o acreditación.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Streck ofrece gratuitamente a todos los clientes el STATS®, un programa de control de calidad entre laboratorios. Si desea más información, póngase en contacto con el Departamento de llamando al +1 402-691-7495 o enviando un correo electrónico a [statsdata@streck.com](#). En el sitio web [streck.com](#) encontrará más información.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Si necesita ayuda, llame a nuestro Departamento de Servicio a Clientes al teléfono +1 402-333-1982. En el sitio web [streck.com](#) encontrará más información.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Vea la pestaña de instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto, en [streck.com](#).

En [streck.com/patents](#) encontrará las patentes que pueden estar relacionadas con este producto.

BRUKSANVISNING**ANVÄNDNINGSMRÅDE**

Cell-Chex® är en analyserad kontroll avsedd för kontroll av totalcellräkningar som utförs manuellt med en hemacytometer för att validera kvantifiering av röda och vita blodkroppar i patienters cerebrospinalvätske- och kroppsätskeprover, inklusive pleura-, perikard-, peritoneal- och synovialvätska. Nivå 1-UC innehåller mononatrium-uratkristaller och nivå 1-CC innehåller kalciumpyrofosfatdihydrat vilka kan användas till att kontrollera förekomsten av kristaller i synovialvätska.

Cell-Chex är också avsedd för kontroll av differentialräkning av vita blodkroppar (mononukleära och polymorfonukleära; neutrofila, eosinofila, basofila, lymfocyter och monocyter) i kroppsätskeprover som utförs med Cytospin-utstryk.

SAMMANFATTNING OCH PRINCIPER

Mikroskopisk utvärdering av cerebrospinalvätska och andra kroppsätskor utgör en viktig del av rutinmässig analys av kroppsätskeprover. Totalcellräkning, kristallidentifikation och differentialräkning av vita blodkroppar kan ge värdefull information avseende infektions- och blödningstillstånd, maligna och inflammatöriska tillstånd samt irritation i ledspringor. Totalcellräkningar och kristallidentifikation utförs med en hemacytometer med användning av outspädd eller spädd kroppsätska. Kristallanalys kan utföras med hjälp av ljus- eller polariserad ljusmikroskop enligt labbprotokollrutiner för kristallidentifikation. Differentialräkning av celler i kroppsätskor utförs med Cytospin-utstryk färgade med användning av rutinmässiga hematologiska färgningsmetoder.

När Cell-Chex kroppsätskekontroll hanteras som ett patientprov, ger den totalcellräkningar och differentialräkningar av celler inom de förväntade områden som anges på analysbladet.

REAGENSER

Cell-Chex kroppsätskekontroll innehåller stabiliseringa humana röda blodkroppar, humana vita blodkroppar, mononatrium-uratkristaller (endast nivå 1-UC) och CPPD-kristaller (endast nivå 1-CC) i ett konserveringsmedel.

FÖRSIKTIGHETSÄGÄRDER

1. För in vitro-diagnostik.
2. **VAR FÖRSIKTIG:** Alla blodprodukter ska behandlas som om de var potentiellt infektiösa. Källmaterialet från vilket denna produkt levereras, var negativt då det testades i enlighet med gällande FDA-krav. Inga kända testmetoder kan säkra att produkter levererade från humant blod inte överför infektiösa agenter. Se instruktionsfliken (IFU) under Resurser på produktsidan på streck.com för specifika FDA-krav för blodprov.
3. Denna produkt får inte bortskaffas tillsammans med vanligt avfall utan skall bortskaffas såsom infektiöst medicinskt avfall. Förbränning rekommenderas.
4. Denna produkt är avsedd att användas i levererat skick. Förfärring genom tillsats av material av något slag till produkten såsom den levereras gör all diagnostisk användning av produkten ogiltig. Undantag: Om Nivå 2-kontrollen späds som anges i 3.a. under Bruksanvisning.
5. Säkerhetsdatablad kan hämtas från streck.com eller kan fås genom att ringa +1 402-691-7510 eller närmaste leverantör.

FÖRVARING OCH HÄLLBARHET

Cell-Chex kroppsätskekontroll är hållbar t.o.m. angivet utgångsdatum förutsatt att den förvaras vid 2 – 10 °C. Efter att produkten har öppnats är Cell-Chex hållbar t.o.m. det datum som anges på analysbladet beträffande öppna flaskan, förutsatt att den förvaras vid 2 – 10 °C.

TECKEN PÅ NEDBRYTNING AV PRODUKTEN

Oförmåga att erhålla förväntade värden för totalcellräkningar eller oförmåga att differentiera mellan celltyper kan vara tecken på produktnedbrytning. Om erhållna värden inte faller inom förväntade områden:

1. Granska avsnitten Bruksanvisning och Begränsningar på kontrollproduktens bipacksedel.
2. Kontrollera utgångsdatumet för Cell-Chex. Kassera produkt som överskrider utgångsdatumet.
3. Analysera en öppnad flaska Cell-Chex. Om värdena fortfarande ligger utanför förväntat område, kontakta Streck teknisk service på +1 402-691-7510 (inom U.S.A.) eller on-line på technicalservices@streck.com.

BRUKSANVISNING

1. Ta ut kontrollerna ur kylskåpet. Det är inte nödvändigt att värma kontrollerna till rumstemperatur före användning.
2. Blanda innehållet: (**Blanda INTE på mekaniskt sätt eller vortexblanda.**)

För att se en videodemstration, besök streck.com/mixing.

- a. Håll flaskan lodrätt och rulla varje flaska mellan handflatorna i 15-20 sekunder.



- b. Fortsätt att blanda genom att hålla flaskan vid ändarna mellan tummen och ett finger, och vänd flaskan snabbt 20 gånger med en snabb vridande rörelse av handleden.



- c. Analysera produkten omedelbart efter blandning. Efterföljande analyser under denna analysperiod kan utföras genom att vända flaskan 5 gånger före provtagning.

d. Steg a-c måste upprepas när provet tas ut ur kylskåp under hela öppen-flaskperioden.

3. Använd Cell-Chex-kontroller på samma sätt som du skulle använda ett patientprov. Prover måste avlägsnas med ett rent kapillärör eller en pipettspets. Flaskan måste förslutas omedelbart efter att provet tagits. Var försiktig så att korskontamination av kontroller förhindras.

a. För räkningar med hemacytometer, se bipacksedeln till hemacytometern för specifika anvisningar. Nivå 2-kontrollen är tillräckligt koncentrerad för spädning och för att erhålla ett rapporterbart värde.

Swedish (Svenska)

4. Om Cell-Chex används för kontroll av synovialvätska och analys av kristaller i synovialvätska, kan ytterligare kristallutvärdering av en positiv kontroll utföras med användning av polariserad ljusmikroskop eller genom att följa vedertaget laboratorieprotokoll för analys av synovialvätska.
- c. För differentialräkningar av vita blodkroppar förbereds ett Cytospin-utstryk enligt laboratoriets etablerade procedur. För att uppnå optimalt resultat skall 250 µL kontrollprodukt användas. **Tillsats av annat material till Cell-Chex före beredning av ett utstryk är inte nödvändigt och inte heller rekommenderat.** Färga Cytospin-utstrycket av Cell-Chex enligt laboratoriets etablerade procedur för rutinmässig hematologi. **Det differentialräkningspreparat som används för att erhålla Cell-Chex-analysvärden centrifugeras i 7 minuter vid 500 varv/min.**
4. Efter samplings ska flaskan sättas tillbaka i kylskåpet för att bibehålla maximalt hållbarhet hos den öppnade flaskan. Torka av gängorna på både flaskan och locket innan locket sätts på och flaskan återförs till kylskåpet.

BEGÄRSNINGAR

1. Analys av Cell-Chex kan inte utföras på en automatisk hematologianalysator. Processen för stabilisering av röda blodkroppar gör att dessa interfererar med cellräkningen av vita blodkroppar.
2. Cell-Chex vita blodkroppar är stabilisera. Det är inte nödvändigt att för behandla Cell-Chex före beredning av ett Cytospin-utstryk.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Tilldelade värden för röda blodkroppar, vita blodkroppar och differentialräkningsvärden bestämdes genom replikatanalysar av räkningar med hemacytometer och färgade Cytospin-utstryk. Tilldelade värden för totalcellräkningar är baserade på det genomsnittliga antalet celler per µL som räknats i de nio stora rutorna på båda sidorna av den Neubauer-förbättrade hemacytometers räknekkammare. Tilldelade värden för differentialräkningar av celler är baserade på replikat av 100-cellidifferentialer. Analysområdesvärden fastställdes baserade på +/- 3 SD för parametrar för differentiering av leukocytter (WBC) och +/- 2 SD för parametrarna för erytrocyter (RBC) och leukocytter (WBC). När ett nytt kontrollparti tas emot, bör varje laboratorium fastställa sina egna medelvärden och gränser för varje parameter. De kontrollmedelvärden som fastställs av laboratoriet skall dock falla inom det förväntade området som specificeras för kontrollen.

PRESTANDAEGENSKAPER

De tilldelade cellulära komponentvärdena visas som ett medelvärdes- och ett utbytesområde. Medelvärdena för den cellulära komponentanalysen härleds från upprepad testning på flera produktflaskor med användning av Neubauer-förbättrade hemacytometer, som används och underhålls i enlighet med tillverkarens anvisningar. Värdena för cellulär analys av differentialräkning av vita blodkroppar fastställdes genom att utvärdera upprepade Cytospin-utstryk från olika flaskor som körs i enlighet med tillverkarens anvisningar. Kristaller identifieras som "present" (förekommer) eller "not present" (saknas), saknar ett utbytesområde och fastställs visuellt med användning av hemacytometer på representativa flaskor. Utbytesområdena för cellulära komponenter är avsedda att återspegla laboratorievariabilitet, och de är därför inom +/- 3 SD för parametrar för differentiering av leukocytter (WBC) och +/- 2 SD för parametrar för erytrocyter (RBC) och leukocytter (WBC). Kvalitetskontroll ska alltid utföras enligt med god laboratoriepraxis, laborariechefens krav och eventuella krav från tillsyns- och akrediteringsmyndigheter.

PROGRAM FÖR KVALITETSKONTROLL

Streck erbjuder alla kunder kostnadsfritt STATS®, ett interlaboratorieprogram för kvalitetskontroll. Om du vill ha mer information, kontakta avdelningen för STATS på +1 402-691-7495 eller statsdata@streck.com. Ytterligare information finns på streck.com.

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Kontakta Customer Service-avdelningen på +1 402-333-1982 för assistans. Ytterligare information finns on-line på streck.com.

ORDLISTA ÖVER SYMBOLER

Se Instruktionsfliken (IFU) under Resurser på produktsidan på streck.com.

Se streck.com/patents för information om patent som kan omfatta denna produkt.



350468-16
2020-04